

### przygotowanie do badania z preparatem CitraFleet

Termin badania .....

godz.: .....

Szanowni Państwo!

W trosce o należyte przygotowanie do badania prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

Kolonoskopia – badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego pozwalające na ocenę śluzówki całego jelita grubego oraz początkowego odcinka jelita cienkiego. Aby było to możliwe należy jelito odpowiednio przygotować środkiem przeczyszczającym.

**Na 5 dni przed planowanym badaniem** nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek), maku, siemienia lnianego oraz pieczywa z ziarnami zbóż.

**W dniu poprzedzającym badanie** korzystne jest spożywanie wyłącznie małych posiłków przygotowanych z żywności ubogoresztkowej np. ser kremowy, twarożek, jajka, czysty bulion, klarowny kisiel, chleb tostowy + tłuszcze (margaryna, masło), w niewielkich ilościach cukier, słodzik.

**Preparat CitraFleet** przyjmuje się doustnie w 2 dawkach po 150 ml każda w następujących godzinach:

1) Pierwsza dawka..... godz. ....

2) Druga dawka..... godz. ....

3) Ostatnia szklanka wody ..... godz. ....

W przypadku każdej dawki należy postępować następująco:

Krok I – Wsypać zawartość 1 saszetki do filiżanki zimnej wody (150 ml)

Krok II – Mieszać przez 2-3 min. Mętną zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu.

Krok III – Popić 250 ml dozwolonego płynu.

Krok IV – Co 15-20 minut wypijać 250 ml wody do ilości minimum 2 litrów po każdej dawce preparatu, w sumie ok. 4 litry.

**Po wypiciu pierwszej dawki preparatu nie wolno już nic jeść.**

W celu zapewnienia właściwego nawodnienia należy pić wodę lub inne klarowne płyny do momentu ustąpienia działania przeczyszczającego.

**Można pić do 3 - 4 godzin przed badaniem.** Dozwolone płyny to: woda, klarowne soki, słaba herbata, czysty bulion. Płyny mogą być ciepłe.

#### Informacje ogólne:

1. Leki kardiologiczne, wziewne oraz endokrynologiczne należy zażyć w godzinach rannych, popijając niewielką ilością wody.
2. Osoby chore na cukrzycę (po konsultacji z lekarzem prowadzącym) w dniu badania nie powinny brać insuliny oraz leków doustnych przeciwcukrzycowych.
3. Osoby przyjmujące leki wpływające na krzepliwość krwi (np. Acard, Aspirynę, Acenocumarol, Xarelto, Pradaxa) powinny o tym poinformować lekarza wykonującego badanie.
4. Na badanie endoskopowe proszę zgłosić się z dowodem osobistym oraz dokumentacją medyczną o chorobach towarzyszących, przebytych leczeniach, zabiegach operacyjnych, wykazem przyjmowanych aktualnie leków.

5. W przypadku stosowania krótkotrwałego znieczulenia dożylnego:
  - należy zgłosić się z osobą towarzyszącą (dorosłą)
  - po zabiegu nie wolno jeść ani pić przez 2 godziny
  - przez 24 godziny obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu, obsługi maszyn, picia alkoholu
6. Wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów w okresie około zabiegowym należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
7. Wyznaczona godzina może ulec zmianie, ponieważ rzeczywisty czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.
8. Prosimy o zgłoszenie się do Pracowni Endoskopowej wcześniej (ok.10 minut przed ustaloną godziną badania).
9. Wynik badania pacjent otrzymuje od razu, natomiast wynik badania histopatologicznego po ok. 14 dniach roboczych.

W przypadku rezygnacji z badania prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie.

Tel. 519 308 200

**W PRZYPADKU BRAKU KONTAKTU ZE STRONY BETAMED S.A. NA JEDEN DZIEŃ PRZED PLANOWANYM BADANIEM, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU 32 420 29 00 W CELU POTWIERDZENIA DATY I GODZINY BADANIA.**